

<p>Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice ZAKŁAD ANALITYKI I BIOCHEMII KLINICZNEJ sekretariat tel. (+48) 32 278-94-38, fax. (+48) 32 278-93-88 Punkt Przyjmowania Materiału (+48) 32 278 94 41</p>	<p>BADANIE MOCZU 01.04.2019</p>
	<p>STRONA 1 z 1</p>

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

(elektrolity, białko całkowite, albumina, glukoza, kreatynina, mocznik (azot mocznika), kortyzol, aldosteron, białko Bence-Jonesa, białko monoklonalne)

Przygotowanie

- ♦ przygotować czysty pojemnik z nakrętką o objętości 2–3 litrów, najlepiej z podziałką oraz jednorazowy pojemnik z nakrętką, o pojemności 50–100 ml (dostępne w aptece)
- ♦ w dniu poprzedzającym badanie oraz w dniu badania należy unikać znacznego wysiłku fizycznego
- ♦ nie przeprowadzać dobowej zbiórki moczu podczas, i w ciągu 3 dni po zakończeniu okresu menstruacyjnego
- ♦ pozostałe, szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania się do badania należy ustalić indywidualnie z lekarzem prowadzącym

Wykonanie

- ♦ **I dzień**
 - rano, po wstaniu np. godz. 6⁰⁰ pierwszą porcję moczu oddać do toalety
 - zapisać czas oddania pierwszej porcji moczu
 - wszystkie następne porcje moczu oddawać do przygotowanego pojemnika
- ♦ **Pojemnik, przez cały okres zbiórki przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu**
- ♦ **II dzień**
 - rano o godz. 6⁰⁰ do naczynia oddać tylko pierwszą porcję moczu po przerwie nocnej
 - zapisać czas oddania ostatniej porcji moczu
 - zmierzyć objętość moczu w pojemniku
 - mocz dokładnie wymieszać, a następnie odlać ok. 50–100 ml do jednorazowego pojemnika na badanie ogólne
 - pojemnik opisać: imię, nazwisko, objętość moczu, dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
- ♦ **mocz dostarczyć** do Punktu Pobierania Krwi Instytutu (**pacjenci ambulatoryjni**) lub do Punktu Przyjmowania Materiału i Wydawania Wyników ZAiBK - laboratorium II-piętro (**pacjenci wykonujący badanie odpłatnie**) tak szybko, jak to możliwe (do chwili dostarczenia przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu, najlepiej w temp. lodówki 2-8⁰C)